

Signalizácia

Témou signalizácie je upozornenie na škodcu čerešní a višní – **vrťivku čerešňovú**, ktorá spôsobuje červivosť plodov. Táto vrťivka poškodzuje hostiteľské rastliny niekoľko týždňov po odkvitnutí. Na určenie správneho termínu ošetrovania odporúčame sledovať bazu čiernu (približne 3 dni po začiatku kvitnutia bazy možno vykonať postrek).

Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých jedincov sú povolené nasledujúce **pomocné prípravky**: Arboband, Floraband, Chemstop spray, Lepové dosky – biele vonkajšie, Lepové dosky – modré interiérové, Lepové dosky – žlté interiérové, Lepové dosky – žlté vonkajšie, Lepové šípky – žlté interiérové, Prípravok na ochranu stromov v spreji, Vermifix – Lepidlo v spreji na ochranu stromov a rastlín (iba v malospotrebiteľskom balení – MB, vhodné pre záhradkárov) (účinná látka polyolefíny), ďalej Arboband – lepové dosky žlté a Žlté sférické lapače, aj v MB, s rovnakou účinnou látkou.

Na chemickú ochranu sú povolené **insekticídy**: Decis EW 50, Decis Expert 100 EC, Decis Forte, Decis Protech, Delta EW 50, Delta Expert, Dinastia, Dinastia Expert, Dinastia Forte, Nuyard, Patriot (účinná látka deltamethrin) a Sanium Ultra (iba v MB); Exirel aj v MB, Irazu (účinná látka cyantraniliprole); Mospilan 20 SP (účinná látka acetamiprid) (aj v MB) a Vošky-Molice Stop (iba v MB) alebo bioagens prípravok Nema-Care (účinné zložky živé makroorganizmami *Steinernema feltiae* a *Steinernema carpocapsae*) (aj v MB). Na primeranú ochranu postačuje jedno ošetrovanie, pričom sa ošetrujú iba poloneskoré a neskoré odrody (nie „májovky“). V každom prípade je nevyhnutné dodržať hygienickú ochrannú dobu pred zberom plodov.

Ďalej upozorňujeme na škodcu – **kvetárku kapustovú**, ktorá poškodzuje priesady kapustovej zeleniny. Dôležité je poznamenať, že za suchého počasia bývajú škody vyššie. Preventívna ochrana spočíva predovšetkým v správnom striedaní plodín, ničení burín a odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predchádzajúcom roku.

Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú **pomocné prípravky**: Arboband – lepové dosky biele, Biele lepové doštičky, aj v MB (účinná látka polyolefíny), a Stopset B, tiež v MB (účinná látka polypropylén). Do porastov sa umiestňujú po vysadení sadeníc.

Ochrana má opodstatnenie iba v prípade opakovaných silných výskytov v predchádzajúcich rokoch. Na chemickú ochranu sú povolené **insekticídy**: Belem 0,8 MG (účinná látka cypermethrin), Benevia aj v MB, Lumiposa 625 FS, Lumiposa XTRA OSR a Lumiposa (účinná látka cyantraniliprole), Buteo Start (účinná látka flupyradifurone), Delmetros 100 SC, Deltik 100 SC, Dethrin 100 SC, Koron 100 SC (účinná látka deltamethrin); pomocný prípravok Nema-Care (bioagens, aj MB) so živými makroorganizmami - *Steinernema carpocapsae* a *Steinernema feltiae*.

Doterajšie suché počasie vyhovuje **múčnatke viniča**, preto odporúčame najmä v rizikových lokalitách 2 predkvetové ošetrovania. Detailnejšie informácie možno nájsť v týždennej **špeciálnej signalizácii** na stránke: www.uksup.sk/specialna-signalizacia. Na záver **upozorňujeme na nálety obalovača slivkového a obalovača broskyňového**, ktorých početnosť narastá. Presnejšie termíny ošetrovania zverejníme o týždeň.

Upozorňujeme, že pri korektnom použití uvedených chemických prípravkov je dôležité riadiť sa pokynmi uvedenými na etikete konkrétneho autorizovaného prípravku na ochranu rastlín.

Ing. Maroš Lučaj

ÚKSÚP – OOR

11.05.2026