

Signalizácia

Nálety obaľovačov na ovocných stromoch sú pozorované od začiatku mája. Na základe týchto zistení upozorňujeme na **obaľovača slivkového** - *Grapholita funebrana* a **broskyňového** (syn. obaľovač východný) - *Grapholita molesta*. Dôležité je zvýrazniť, že početnosť týchto škodlivých organizmov môžeme považovať za kolísavú, ale i tak presahuje kritické hodnoty na vykonanie ošetrovania.

V rámci **ochrany** sú povolené pomocné prípravky na sledovanie náletov, ktorými sú Deltastop CM s účinnými látkami (Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát a (Z)-8-dodecen-1-ol) vhodný na signalizáciu náletu obaľovača broskyňového, a Deltastop CF s účinnými látkami (Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát a dodecyl acetát) na obaľovača slivkového. Oba sú dostupné aj v malospotrebitel'skom balení (MB).

Proti obaľovačovi broskyňovému sú povolené insekticídy s účinnou látkou lambda-cyhalothrin - Karate Zeon 5 CS (aj v MB), Karate Zeon 050 CS, Karathe Zeon 5 CS, Kusti, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro a Samuraj, ktorý je iba v MB; selektívne biologický insekticídny prípravok Lepinox Plus (účinná zložka *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* kmeň EG 2348), ktorý je tiež dostupný v MB. Využiť môžeme postrekový biologický insekticíd Carpovirusine (účinná zložka *Cydia pomonella* Granulosis Virus M - CpGV-M), ktorý je určený na obaľovača broskyňového v kôstkovinách, ale aj slivkového konkrétne na orech pri tomto druhu. Insekticídy Aceiro 200 SL, Harakiri, Leptostar 200 SL, Luminis, Tazonit 200 SL, Verdalia (účinná látka acetamiprid) sú použiteľné na oba druhy spomínaných obaľovačov. Na obaľovača slivkového môžeme využiť aj insekticíd Mospilan 20 SP, ktorý je iba v MB.

V ďalšej skupine sú insekticídy ako - Affirm (účinná látka emamectin); Exirel, Irazu (účinná látka cyantraniliprole), ktoré sú všeobecne povolené na obaľovače alebo prípravky aplikovateľné proti cicavým a žravým škodcom - Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Dinastia (účinná látka deltamethrin) a iba v MB Sanium Ultra a Sanium Ultra AL. Dôležité je spomenúť, že všetky môžu byť použiteľné na oba spomenuté druhy obaľovačov.

Orientačné dátumové ohraničenie postrekov pre celé územie Slovenskej republiky:

<u>územie Slovenskej republiky</u>	<u>obaľovač broskyňový</u>	<u>obaľovač slivkový</u>
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	20.-22. mája	23.-25. mája
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)	24.-27. mája	28.-31. mája
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)	31. mája - 4. júna	2.-6. júna
polohy nad 600 m	ešte plus 5-7 dní	

Záverom poznamenávame, že uplynulý daždivý týždeň okrem zmiernenia sucha prospieva aj rozvoju **plesni zemiakovej, plesni cibulovej, chrastavitosti jadrovín či ďalších vlhkomilných chorôb**. Pre určenie termínu ošetrovania proti plesni zemiakovej a peronospóre viniča odporúčame sledovať špeciálnu signalizáciu zverejňovanú na stránke www.uksup.sk.

Počas použitia menovaných prípravkov na ochranu rastlín je podmienkou riadiť sa pokynmi pre ich aplikáciu, ktoré sú uvedené na etikete konkrétneho prípravku na ochranu rastlín!

Ing. Maroš Lučaj

ÚKSÚP – OOR

18.05.2026